

Co se bude dít po biopsii?

Samotný zdravotní výkon trvá přibližně půl hodiny. Po něm je třeba vyčkat ještě 15 minut v čekárně.

Místo vpichu se obecně doporučuje ledovat. Po odeznění znecitlivění můžete cítit mírnou bolestivost.

V den výkonu není vhodná fyzická námaha. Druhý den večer můžete krycí obvaz sundat a osprchovat se. Může se objevit modřina (hematom), která se během jednoho týdne vstřebá.

Za jak dlouho budu vědět výsledek?

Odebrané vzorky tkáně prsu jsou odeslány na histologické vyšetření. Zpracování výsledků trvá obvykle 1–2 týdny. Výsledek biopsie se sděluje přímo pacientce v dohodnutém termínu.

Biopsie je vyšetření, kterého se nemusíte obávat. Snažte se být v rámci možností klidní a důvěřujte zdravotníkům.

Přejeme vám, aby byl výsledek co nejpríznivější.



BIOPSIE prsu



Milá pacientko, milý paciente,

pokud vám byla právě naplánována biopsie prsu, pokusíme se vám na následujících stranách přiblížit, jak vše probíhá, abyste výkon mohli absolvovat bez zbytečných obav.

Co je to biopsie?

Biopsie spočívá v odebrání malého množství tkáně. Využívá se tam, kde předchozí metody (mamografie nebo ultrazvuk) nedaly dostatečné množství informací.

Tkáň se získává pomocí speciálních bioptických jehel. Oblast zájmu je zacílena ultrazvukem nebo mamograficky. Následně jsou vzorky vyhodnoceny v laboratoři patologem. Zjištěné výsledky doplní informace předchozích vyšetření a lze tak dále naplánovat cílenou léčbu.

Je třeba se na vyšetření připravit?

Biopsii nepředchází žádná speciální příprava. Není třeba chodit nalačno, naopak doporučujeme, abyste se najedli a vzali léky, které běžně užíváte.

Pokud dlouhodobě užíváte léky prodlužující krvácivost (např. Acylpyrin, heparinové preparáty apod.), informujte o tom personál již při objednání.

Také nás prosíme informujte, máte-li alergii na preparáty, které se používají k lokálnímu znecitlivění (např. Mesocain).

Jak probíhá biopsie?

Nejprve s vámi sepíšeme informovaný souhlas. Při biopsii pod ultrazvukovou kontrolou (core cut), buď ležíte na zádech, nebo na boku. Po zaměření ložiska bude provedeno znecitlivění místa vpichu injekcí anestetika (např. Mesocain 1%) a poté krátké naříznutí kůže. Speciální jehlou vám potom odebereme vzorky, jejichž počet závisí na typu ložiska i na dalších parametrech. Následuje stlačení místa vpichu a přiložení krycího obvazu.

V případě, že podezřelé změny nejdou zaměřit ultrazvukem, ale jsou naopak dobře čitelné na mamografii, odběr vzorku se provádí pod mamografickou kontrolou se stereotaktickým zaměřením (tzv. SCCB). Žena sedí nebo leží u mamografu. Prso má stlačené a místo, ze kterého se provádí odběr vzorků, má znecitlivěné. Péče po odběru je stejná jako u core cut biopsie.

