

CEA - karcinoembryonální antigen

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
		Laboratorní příručka OKB			
Seznam základních a speciálních vyšetření					
		platí od: 1.3.2024			
CEA - KARCINOEMBRYONÁLNÍ ANTIGEN			CEA		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	5,5 %		
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	µg/l		
Referenční meze	<table><tr><td>sérum</td><td>0-5,8 µg/l</td></tr></table>			sérum	0-5,8 µg/l
sérum	0-5,8 µg/l				
SOP	SOPV 260				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81249	19519				
Poznámka	kuřáci mají zvýšené hodnoty, hodnoty zvyšuje chronický alkoholismus a aktivní alkoholická cirhóza jater				
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	-				
Stabilita při 4-8°C	1 týden				
Stabilita při -20°C	1 rok				

Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	hodnoty zvyšuje: kontaminace slinami, alkoholismus, kouření, benigní stavy (zánětlivé stavy)
Biologický poločas	14 dní